

FILLERPROXIDIL® فيلبروكسيديل

محلول للشعر مع

عامل النمو البطاني الوعائي الـ VEGF

مرجعية مستحضرات التجميل الطبية



A-line
— Lab - Brazil —
COSMETICS

عبوة تحتوي على: 01 شامبو 120 مل + 01 بلسم 120 مل + 04 أمبولات 6 مل لكل وحدة و 01 مكمل غذائي 240 جرام.

لا تستخدم هذا المنتج إذا كنت تعاني من جروح أو إصابة في الجلد.

تعتمد فعالية هذا الدواء على القدرة الوظيفية للمريض.

أمبولة فيلبروكسيديل Fillerproxidil® شفافة إلى محلول مصفر قليلاً.

ما هو الغرض من هذا العلاج؟

يستخدم فيلبروكسيديل Fillerproxidil® للعلاج الموضعي للثعلبة الأندروجينية، والثعلبة البقعية، وتساقط الشعر الكربي، وفروة الرأس الدهنية، وقشرة الرأس. حيث يعمل على تنظيف بصيلة الشعر ويحفز نمو الشعر.

كيف يعمل فيلبروكسيديل Fillerproxidil®؟

يعمل فيلبروكسيديل Fillerproxidil® عن طريق عكس ضمور البصيلات الناجم عن هرمون DHT. يزيد من حجم البصيلات. يحفز تولد الأوعية الشعرية: ظهور شعيرات دموية جديدة تحيط بالبصيلة الجديدة - وهو أمر ضروري لتغذية الشعر وحيويته. مع تطبيق فيلبروكسيديل Fillerproxidil® مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهر، تبدأ النتائج في الظهور. يبدأ الشعر الجديد في النمو ويقل تساقط الشعر. نوصي بتطبيق مجموعة فيلبروكسيديل Fillerproxidil® لمدة ثلاثة أشهر لتحقيق نتائج 100% لوقف تساقط الشعر ولكي يصبح نمو الشعيرات الجديدة واضحاً. قد يختلف الأفراد في كمية الشعر الذي سيعاد نموه والوقت الذي يستغرقه لتحقيق أفضل النتائج.

ملاحظات وموانع

قبل استخدام فيلبروكسيديل Fillerproxidil®، تأكد من صحة فروة الرأس. لا تستخدمه إذا كان الجلد أو فروة الرأس مصابة، أو ملتهبة، أو حمراء، أو متهيجة، أو مسببة إلى ألم، أو تحت ظروف حروق الشمس أو التهاب الجلد. لا تستخدم المنتج إذا كان لديك رد فعل تحسسي تجاه أي من مكونات التركيبة. يحتوي فيلبروكسيديل Fillerproxidil® على ميثيل نيكوتينات في تركيبته، وهو نشط مفرط الدم، وحيوي، وموسع للأوعية، مما يسبب احمراراً وإحساساً طفيفاً بالاحترار الموضعي. هذا التأثير طبيعي وضروري بحيث يكون هناك زيادة في أكسجة الدم، وهو أمر ضروري في عملية تحفيز ظهور شعر جديد. لا يسبب الحساسية. تستمر التأثيرات لمدة 3-5 دقائق بعد التطبيق. بعد وضع الأمبولة، انتظر 15 دقيقة على الأقل قبل استخدام مجففات الشعر، أو الجل أو الكريمات أو سبراي تثبيت الشعر. انتظري 4 ساعات على الأقل قبل غسل شعرك مرة أخرى، إذا لزم الأمر. ضع جرعة إجمالية قدرها 6 مل من الأمبولة على فروة الرأس، مرة واحدة في الأسبوع، بدء التطبيق في وسط المنطقة المصابة (6 قطرات أو 1 مل لكل تطبيق)، حتى لا تتأثر فعالية المنتج. في الحالات التي تشهد فقدان شعر مفاجئ أو متقطع، صلح كامل أو فقدان الشعر في الجسم بأكمله، لا ينصح باستخدام هذه المنتجات. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان سبب تساقط الشعر يرجع إلى استخدام بعض الأدوية، أو نقص حاد في العناصر الغذائية، أو خلال فترة العلاج الكيميائي، أو أمراض أو حالات تتسبب في تلف فروة الرأس، يجب تجنب استخدام هذه المنتجات. لا ينبغي استخدامه إذا كان هناك تاريخ عائلي لتساقط الشعر أو إذا كان سبب تساقط الشعر غير معروف. ينصح بمراجعة الطبيب قبل الاستعمال. لا يتداخل استخدام الصبغات أو التلميس أو التيجيد مع عمل المنتج. ومع ذلك، لتجنب أي تهيج موضعي، تأكد من عدم وجود فيلبروكسيديل Fillerproxidil® على فروة الرأس قبل استخدام أي مواد كيميائية. للحصول على أفضل النتائج، لا تقم بتطبيق المنتج في نفس يوم الإجراءات الكيميائية على الشعر. قم بتخزين المنتجات في درجة حرارة الغرفة (بين 15 درجة مئوية و 30 درجة مئوية). يجب الحماية من الضوء والحرارة والرطوبة. احفظ الزجاجات مغلقة بإحكام بعد الاستعمال.

كيف يمكنني استخدام المنتجات؟

نظرًا لحقيقة أن مجموعة فيلبروكسيديل Fillerproxidil® تتكون بالكامل من المنتجات الموضعية (باستثناء المكملات الغذائية - الجيلاتين)، فإنه يعتبر أكثر فعالية من مستحضرات التجميل الجدية الأخرى عند وضعه مباشرة على المنطقة المصابة. أظهر 100٪ من المشاركين انخفاضًا في تساقط الشعر في التقييمات السريرية. موضع الاستخدام: يجب أن توضع المنتجات على فروة الرأس، باستثناء المكملات الغذائية (الجيلاتين)، والتي يجب تناولها عن طريق الفم، كما هو محدد.

الأثار الجانبية: من خلال الاختبارات السريرية استنتج أن منتجات Fillerproxidil® لا تسبب أي ردود فعل سلبية لاستخدامها أظهرت الدراسة أنه لم يصرح أي مشارك بعدم الراحة بعد استخدام المنتجات. لم يتم الكشف عن أي علامات سريرية لردود فعل سلبية.

الشامبو والبلسم والأمبولة: تطبيق مرة واحدة في الأسبوع.

اغسلي الشعر بشامبو فيلبروكسيديل Fillerproxidil®، ضعي المنتج على راحة اليدين ووزعيه مباشرة على فروة الرأس المبللة. قومي بعمل تدليك خفيف بأطراف أصابعك واتركيه لمدة 3 دقائق. لتنظيف وتطهير أفضل، كرري العملية. اغسليه جيدا بالماء.

ملاحظة: هذا الشامبو هو علاج لفروة الرأس. لذلك لا ينصح باستخدامه لغسل الشعر. تكفي الرغوة التي تتشكل في التطبيق لتنظيف الشعر أثناء استخدام الشامبو.



ضعي بلسم فيلبروكسيديل Fillerproxidil® على كامل طول الشعر بعيدًا عن فروة الرأس. دلكي الشعر برفق وانتظري 3 دقائق. اشطفيه جيدا وجففيه بمنشفة.



ثم ضعي أمبولة فيلبروكسيديل Fillerproxidil® مباشرة على فروة رأس رطبة. قومي بعمل تدليك دائري خفيف بأطراف الأصابع لا تشطفيه. انتظري لمدة 15 دقيقة حتى يتم امتصاص المكونات النشطة بالكامل. أنهي تسريحة شعرك كما تشاء.



تناولي 2 (حبتين) من المكملات الغذائية (الجيلاتين) في اليوم. الاستهلاك اليومي للمكملات الغذائية ضروري للحصول على نتائج جيدة.

